МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

1) Удаление бородавок, папиллом, милиумов, невусов, гемангиом и иных доброкачественных новообразований с применением лазерной коагуляции (деструкции)

Воздействие осуществляют в непрерывном режиме работы лазерного аппарата с экспозицией от 2-5 секунд до 2-3 минут в зависимости от размера образования.

После облучения разрушенные ткани удаляют стерильным марлевым тампоном, смоченным водным раствором Хоргексидина биглюконата **0,05%**.

Деструкцию проводят под местной анестезией.

Рекомендации.

Пациенту рекомендуется обрабатывать ранку после удаления раствором хлоргексидина или мирамистина, наносить косметической палочкой макающими движениями, затем сразу порошок "Банеоцин"-3 раза в день в течение 5-7 дней или раствор Фукорцина 2-3 раза в день в течение 5-7 дней
Также не избегать травмирования раны и контакта с водой, а также самостоятельно не удалять струп до окончания процесса заживления.

Общие правила, которых следует придерживаться:

1. Первые несколько дней не мочите рану, где ранее было новообразование.
2. После удаления лазерным способом не следует подвергать кожу действию ультрафиолетовых лучей. Стоит исключить посещение солярия и длительное время пребывание на солнце. Пренебрежение данным правилом может обернуться пигментацией рубца.
3. В течение месяца после процедуры нужно пользоваться солнцезащитным кремом.
4. Стоит отказаться от скрабов, лосьонов и тоников если вы удалили родинку на лице. Так же будет нежелательным применение тональных средств и косметики в течение 2 недель после процедуры.
5. В течение недели запрещено употреблять алкоголь, поскольку он способствует расширению сосудов, что может стать причиной кровотечения.
6. Не допускать попадания на прооперированное место средств бытовой химии.
7. Не рекомендуется посещать сауны и бассейн первые пару недель для уменьшения риска проникновения инфекции в месте, где было новообразование.
8. Если же новообразование удалили в области гениталий, нужно отказаться на некоторое время от интимной близости.

Риски

Медицинский риск как вероятность наступления неблагоприятного исхода в процессе оказания врачом и подконтрольным ему медицинским персоналом медицинской помощи, возникает при выполнении всех необходимых в интересах пациента действий с целью диагностики, лечения и профилактики заболеваний, внимательном и разумном их выполнении в соответствии с современными данными медицинской науки.

Медицинский риск наступления нежелательных последствий является составной частью медицинских манипуляций. Избежать реализации медицинского риска невозможно из-за индивидуального реагирования каждого больного на медицинские манипуляции.

Лазер имеет высокую точность действия. Лазер – это сильный антисептик, он обеспечивает

стерильность и активное восстановление клеток и тканей. Воздействие лазера дозировано.

Возможные риски развития осложнений и неприятных ощущений в виде:

аллергической реакции, болезненности, отечности, гиперпигментации, покраснения кожи, появление корочки, появления рубца (гипертрофического и гипотрофического) на месте удаления новообразования при лазерной коагуляции (деструкции), волдырей, возможно наличие небольшой гематомы (синяков), рецидива.

Последствия и результаты оказания медицинской помощи:

- клиническое выздоровление;
- отсутствие шрамов;

Если спустя пару дней после процедуры «лазерное удаление новообразования» в зоне ранки будет наблюдаться отек или кровотечение, то нужно незамедлительно обратиться к лечащему врачу, поскольку данные симптомы могут свидетельствовать о развитии инфекции.

Симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к врачу или дополнительного лечения:

- зуд, чрезмерное намокание раны;
- кровотечение из раны;
- высокая температура;
- выделение гноя;
- воспаление кожи продолжительностью в несколько дней.

2) Лазерная шлифовка кожи

Воздействие осуществляют фракционной лазерной установкой CO2, которая обеспечивает омоложения, устраняет рубцы,шрамы,растяжки и морщины. Прибор воздействует на глубокие и поверхностные слои.

Углекислотная (CO2) лазерная шлифовка – система по омоложению, в основе которой работает углекислый газ CO2.

Рекомендации

1.После процедуры наносить крем «Бепантен» от 3 до 10 раз в день, в течение 10 дней;
2.Не умывать лицо в течение 3 дней;
3.Не использовать скрабы, пилинги, абразивные процедуры в течение 4 недель после процедуры;
4.Наносить после процедуры солнцезащитный крем с SPF не < 50 в течение 2 месяцев;
5.Не посещать сауну в течение 3 недель, солярий в течение 2 месяцев;

Риски:

После лазерной шлифовки могут появиться болезненность, отечность, гиперпигментация, покраснения, ощущение жжения (как после солнечного ожога), воспаления и инфицирование, появления рубца (гипертрофического и гипотрофического).

Противопоказания:

Противопоказанием является возраст до 18 лет, беременность. От процедуры нужно отказаться при онкологических, вирусных заболеваниях, инфекциях кожного покрова, сахарном диабете. При обострении хронических заболеваний, фотодерматите и сильном загаре лучше перенести сеанс. При некомпенсированных проблемах с сердцем и эпилепсии делать шлифовку противопоказано.

Последствия и ожидаемые результаты оказания медицинской помощи:

После процедуры отмечается положительное воздействие на кожу. Процедура провоцирует усиленную выработку коллагена и эластина, имеет выраженный омолаживающий эффект. Кожа после шлифовки становится упругой, плотной.

Безопасно. Луч лазера точно направляют на дефект, без захвата здоровых тканей.

3) Фототерапия кожи

Рекомендации:

1.Обработка кожи каждые 3 часа кремом "Бепантен" или "Пантенол" в течении 2-3дней, затем 2-3раза в день 4-5дней.

2. При выходе на улицу наносить крем с SPF 50++

3. В течении 48ч воздержаться от использования декоративной косметики.

4. Исключить бани, сауны, горячие ванны, острую пищу, алкоголь, курение.

Риски:

После фототерапии могут появиться болезненность, воспаление, отечность, гиперпигментация, покраснения, появление корочки, сильного зуда.

Последствия и ожидаемые результаты оказания медицинской помощи:

- оказывает комплексное воздействие, решая одновременно несколько задач – выравнивает тон кожи, подтягивает ее, тонизирует и улучшает тургор, то есть эластичность;
- не затрагивает здоровые ткани, не оказывает на них негативное воздействие;
- замедляет естественный процесс старения кожи;
- отсутствует реабилитационный период, то есть, после процедуры не требуется нахождение в стационаре и какие-либо серьезные ограничения – пациент сразу возвращается к привычному образу жизни и соблюдает рекомендации врача;

4) Фотоэпиляция кожи

Рекомендации:

1.Обработка кожи каждые 3 часа кремом "Бепантен" или "Пантенол" в течении 2-3дней, затем 2-3раза в день 4-5дней.

2. При выходе на улицу наносить крем с SPF 50++

3. В течении 48ч воздержаться от использования декоративной косметики.

4. Исключить бани, сауны, горячие ванны, острую пищу, алкоголь, курение.

Риски:

После фотоэпиляции может появиться гиперпигментация (когда кожа покрывается темными пигментными пятнами), воспаление, отечность, ожог, появление рубца (гипертрофического и гипотрофического), повышение температуры тела, покраснение, легкое чувство жжения.

Последствия и ожидаемые результаты оказания медицинской помощи:

Замедляется рост волос

5) Местная анестезия

Риски:

- анафилактический шок, гиперчувствительность I типа;
- беспокойство и тревожность;
- головная боль, парестезии, головокружение, гипестезия, периферическая нейропатия, сонливость, обморок, судороги, угнетение сознания, потеря сознания, агевзия, большие судорожные припадки, гипотонус, предобморочное состояние, тремор, сенсорное расстройство;
- блефароспазм, диплопия, снижение остроты зрения;
- боль в ухе, звон в ушах;
- сердцебиение, тахикардия, аритмия, брадикардия, остановка сердца и дыхания;
- кровотечение, артериальная гипотензия, артериальная гипертензия;
- гипергидроз, кожный зуд, сыпь, ангионевротический отек, крапивница, эритема;
- боль в спине, мышечная скованность, тризм, остеонекроз, отек тканей лица;
- отечность, боль, гематома, некроз тканей и воспаление в месте введения местного анестетика;
- астения, озноб, утомляемость, недомогание, жажда, повышение температуры тела;
- боль во время проведения местной анестезии, повреждение тканей, повреждение нервов и кровеносных сосудов.

Последствия и ожидаемые результаты оказания медицинской помощи:

Уменьшение чувствительности в области укола и рядом мягких тканей.

6)Внутрикожное введение Дипроспана

Рекомендации:

1) Не мочить, не тереть в течение суток место инъекции

Риски:

После внутрикожного введение Дипроспана может появиться болезненность, жжение, покраснение, отёк, повышение температуры, затруднения дыхания, выраженное ухудшение самочувствия, кровоизлияния или гематома в месте введения, инфицирования в месте инъекции, выраженные аллергические реакции, изменения пигментации кожи, атрофия кожи и/или подкожной клетчатки в месте введения, нарушение заживления тканей, повышение артериального давления, задержка жидкости, повышение уровня глюкозы в крови после внутрикожного введение Дипроспана. Все нежелательные реакции от внутрикожного введение Дипроспана можно ознакомиться в инструкции к препарату на сайте https://www.vidal.ru/drugs/diprospan

Последствия и ожидаемые результаты оказания медицинской помощи:

Разглаживание гипертрофических рубцов после 2-4 инъекций (0,1 мл внутрикожного введения Дипроспана). Перерыв между инъекциями 4-6 недель.